



โรคไข้อีดำไข้อีขาว



โรคไข้อีดำไข้อีขาวเป็นโรคที่พบบ่อยในฤดูร้อน
และฤดูฝน มีอาการไข้สูง 3-5 องศาเซลเซียส
และผื่นขึ้นตามร่างกาย



อาการ

อาการของโรคไข้อีดำไข้อีขาว มีดังนี้
- ไข้สูง 3-5 องศาเซลเซียส
- ผื่นขึ้นตามร่างกาย
- ปวดศีรษะ
- ปวดกล้ามเนื้อ
- ปวดข้อ
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย

การรักษา

- รับประทานยาพาราเซตามอล เพื่อลดไข้
- รับประทานยาแก้ปวดตามอาการ

การป้องกัน

• ระวังอย่าให้เด็กโดนแดดโดยตรง
• ระวังอย่าให้เด็กโดนน้ำฝน



ไอกรน

โรคร้าย อากาศคล้ายหวัด

ติดต่อง่าย อันตรายถึงชีวิต

|| หายใจลำบาก มีน้ำมูก
ไอซ้อนกันถี่ๆ 5 - 10 ครั้ง/มากกว่า
จนทำให้หายใจไม่ทัน หายใจมีเสียงดังวูบ
ให้รีบไปพบแพทย์ **ไม่ซื้อยามาทานเอง** **||**

ป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนแออัด หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

“เล่นอยู่ไหนก็อยู่ในประเทศไทย”



กระทรวงสาธารณสุข



โรคโหรณ

โรคฉาบ

อัมตราบถึง

ยิวต



โรคโหรณเป็นโรคติดต่อ (D. Pertussis) ที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงได้ โดยเฉพาะในทารกแรกเกิด และเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

อาการสำคัญ

มีไข้ 3-4 องศาเซลเซียส
ไอแห้ง ๆ ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน 2-3 สัปดาห์
ไอแห้ง ๆ ที่ 3-4 สัปดาห์ 5-10 ครั้ง/วัน
ไอแห้ง ๆ ที่ 3-4 สัปดาห์ 5-10 ครั้ง/วัน
ไอแห้ง ๆ ที่ 3-4 สัปดาห์ 5-10 ครั้ง/วัน
ไอแห้ง ๆ ที่ 3-4 สัปดาห์ 5-10 ครั้ง/วัน
ไอแห้ง ๆ ที่ 3-4 สัปดาห์ 5-10 ครั้ง/วัน
ไอแห้ง ๆ ที่ 3-4 สัปดาห์ 5-10 ครั้ง/วัน



ฉีดวัคซีนเพื่อ ป้องกันโรคโหรณในเด็ก

อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป 4-5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เป็นเดือนอายุ 2 เดือน
ครั้งที่ 2 เป็นเดือนอายุ 4 เดือน
ครั้งที่ 3 เป็นเดือนอายุ 6 เดือน
ครั้งที่ 4 เป็นเดือนอายุ 18 เดือน
ครั้งที่ 5 เป็นเดือนอายุ 4-5 ปี



Source: WHO, 2019



ศูนย์กุมารเวช
Children's Center

“ไอรุน” โรคที่พ่อแม่ต้องรู้



อาการคล้ายเป็นหวัด
ไอแห้งๆ นานกว่า 10 วัน



หายใจเข้าอย่างแรง
ตาแดง มีน้ำมูก



ป้องกันได้
ด้วยการฉีดวัคซีน



พบบ่อยในการรณรงค์เกิด
ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี



โรงพยาบาลศศิรินทร์
เชียงใหม่ ถนน ภูเก็ต ๕๕๐๐๐๐



1728
www.sikarin.com



Follow Sikarin
@Sikarinhospital